

## ČASNÝ ZÁCHYT KARCINOMU PROSTATY

Karcinom prostaty patří mezi nejčastější zhoubné nádory u mužů a významné nádorové příčiny úmrtí. Četné studie odhalily zásadní význam stanovení hladiny prostatického specifického antigenu (PSA) jako testu pro časnou detekci karcinomu prostaty. Ročně onemocní tímto nádorem okolo 8000 mužů, což je téměř třikrát více


než před přibližně 20 lety. Díky preventivnímu vyšetřování PSA jsou častěji odhalena i časná stadia karcinomu, klinicky dosud nemá, která by se za jiných okolností ještě neprojevila. Ročně umírá na tento nádor přibližně 1500 mužů a v současné době žije v české populaci více než 70 000 mužů s historií tohoto onemocnění.

### Postup pro laboratoře

- Domluva se spolupracujícími urology a praktickými lékaři
- Úprava žádanky na vyšetření, aby obsahovala požadavek na vyšetření screeningového PSA
- Nasmlouvat výkon pro screeningové vyšetření PSA

### PODMÍNKY TESTOVÁNÍ

- Laboratoř má zavedený systém dle EN ČSN 15189 (akreditace ČIA nebo audit NASKL)
- Na vyšetření PSA má platný certifikát EHK



<sup>1</sup>V případě symptomů je referován na další diagnostiku k urologovi

<sup>2</sup>Follow the same schedule for men aged >70 yr with good performance status and life expectancy of at least 10–15 yr

Van Poppel H, Hogenhout R, Albers P, van den Bergh RC, Barentsz JO, Roobol MJ. Early detection of prostate cancer in 2020 and beyond: facts and recommendations for the European Union and the European Commission. Screening. 2021 Mar 1;73:56.